

Untitled Document

Die ou Engelse jagters wat diep, donker Afrika ingevaar het, het die kwêvoël 'go-away bird' genoem. Dit

Deesdae het dié voëls egter goed by mense se teenwoordigheid aangepas. Hulle het in die laat 19

Kenners sê die rede waarom kwêvoëls stede toe begin trek het, is waarskynlik oor die boomryke v

Kwêvoëls vreet hoofsaaklik vrugte, maar sal ook bessies, blomme, blare, termiete, sade, peule (ve



Die kwêvoël

Foto: Wikipedia

Boonste

Die kwêvoël, *Corythoichthya concolor*, gebruik die heel boonste takke van bome as uitkykpunt.

Die kwêvoël is 'n medium-grootte grys voël wat 47–51 cm lank is en hy weeg 200–300 gram. Hy h

Dié voël het 'n lang stert – omtrent dieselfde lengte as sy lyf – wat hy gebruik om in boomtakte te



'n Kwêvoël vang 'n stofbad

Foto: *Loot Eksteen*

Hardloop

Kwêvoëls is gemaak om in bome te leef en dit lyk of hulle dit geniet om op horisontale takke te hang.

Dié voëls kom in groepe van drie tot 20 voëls voor, maar naby water kan hulle swerms van tot 60 voëls hê.

Hulle kies slegs een maat in die broeiseisoen en deel van die hofmaakproses is 'n ritueel waar die maat 'n hofmaakproses is.



In vlug

Foto: Wikimedia

Broei

Kwêvoëls sal dwarsdeur die jaar broei en die mannetjie en wyfie maak beurte om die eiers uit te broei.

Daar word een tot drie amper koeëlronde wit eiers gelê wat 26 tot 28 dae vat om uit te broei. Al twee ouers broei.

Die kleintjies begin rondklouter voor hulle kan vlieg. Hulle begin vlieg as hulle vier weke oud is en vlieg vinnig.