

Untitled Document

Dié voëltjies is 'n graanboer se grootste nagmerrie. Hulle is al beskryf as die sprinkane van

Wanneer 'n miljoen rooibekkeleas op 'n kleingraanoes neerdaal, vreet en mors hulle t

Al waarvoor 'n graanboer kan hoop, is dat dié nomadiese swerms nie op sy grond kom

Die kuikens word met insekte gevoer vir ongeveer 20 dae, waarna hulle on

Buite broeiseisoene kan kweleas 40 km na 'n voedingsbron aflê en weer terugkeer na o



?n Swerm Rooibekkeleas in ?n boom

Foto: Wikipedia

Beweging

Daarom skakel die onderskeie Departemente van Landbou van SADClande maandelik

Masker

Die roibekkelele *Quelea quelea*, is 'n wewragtige voëltjie wat teen 11-13 cm omtrent

Die broeiende wyfie het 'n gelerige snawel. Sy het dieselfde swart en vaal strepe as di



?n Swerm roibekkelele

Foto: Wikipedia

Nes

In die broeiseisoen begin die mannetjie om 'n ovaalvormige raamwerk uit gras uit vir d

Graanboere met kwelele-probleme moet die slaap- of broeikolonies se ligging bepaal e



Rooibekkwelea

Verjaag

Soms is dit nie moontlik om beheeraksies uit te voer nie, en is dit beter om die swerm

Volgens die Departement van Landbou, is die doel van kweleabeheer om die skade aan